

APOCALIPSIS

PAÍS DE ORIGEN


CHINA

NOMBRE COMERCIAL

APOCALIPSIS®

INGREDIENTE ACTIVO

Dimethoate 400 g/l

FÓRMULA EMPÍRICADimetoato: (C₅H₁₂N₀O₃)**FÓRMULA ESTRUCTURA****GRUPO QUÍMICO**

Dimetoato

CLASE DE PRODUCTO

Insecticida Agrícola (INS)

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN

Dimethoate 400 g/l

Concentrado Emulsionable (EC)

MODO DE ACCIÓN Y MECANISMO DE ACCIÓN

Insecticida no sistémico con acción de contacto y estomacal. Afecta el sistema nervioso de los insectos por inhibición de la enzima acetilcolinesterasa, con la subsecuente acumulación del neurotransmisor acetilcolina, lo que provoca la muerte del insecto por sobreestimulación colinérgica.

USOS Y DOSIS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	VOLUMEN DE AGUA
MANGO Mangifera indica	Escama blanca Aulacaspis tubercularis	0.8	250 l/ha
BRÓCOLI Brassica oleracea	Pulgón Brevicoryne brassicae	0.6	400 l/ha



**ORGULLO DE
SER AGRICULTOR**

MODO DE EMPLEO

Para preparar la mezcla, llene el tanque de aspersión hasta la mitad con agua limpia, vierta la dosis recomendada de APOCALIPSIS® y agite bien hasta obtener una solución homogénea, continúe adicionando agua hasta completar el volumen requerido.

No aplicar bajo condiciones que puedan afectar los resultados: polvo sobre las hojas, aguas lodosas con alto contenido de materia orgánica, exceso de rocío sobre las hojas. Se recomienda calibrar el equipo de aspersión para lograr una distribución uniforme

EQUIPO DE APLICACIÓN

La aplicación de APOCALIPSIS® se puede efectuar con equipo terrestre y equipo aéreo. Antes de cargarlo, se debe cerciorar que el equipo de aplicación se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin escapes y debidamente calibrado.

INTERVALO DE APLICACIÓN

Época y Frecuencia de aplicación: Realizar una sola aplicación en presencia de la plaga.

Período de carencia: Mango: 21 días.

Brócoli: 14 días

Reingreso al área tratada: 24 horas

CUIDADOS EN LA APLICACIÓN

En la aplicación del producto y lavado del equipo de aplicación, usar la ropa de protección: camisa de manga larga, pantalón largo, botas de hule, mascarilla, anteojos y guantes. El filtro de la mascarilla debe cambiarse a menudo. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar la llovizna de aspersión (deriva).

COMPATIBILIDAD CON OTROS PRODUCTOS

Incompatible con productos alcalinos, así como formulaciones a base de cobre y azufre.

CONDICIONES EN QUE DEBE SER USADO EL PRODUCTO

APOCALIPSIS® No se puede aplicar en áreas donde se encuentren los trabajadores, el aplicador debe contar con todos los equipos de protección agrícola.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

II: Moderadamente Peligroso (Franja amarilla)

PRECAUCIONES

No comer, beber o fumar durante la utilización de este producto. Lavarse las manos después de su manipulación o contacto. Limpiar a fondo el equipo después de utilizarlo. Las aguas residuales no deben ser vertidas en corrientes de agua, zanjas de drenaje de las fincas o en el sistema de alcantarillado público.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Av. General Enríquez # 8 y Av. General Rumiñahui
Parroquia Cotogchoa - Vale de los Chilos
(02) 208-0350 / (02) 208-2068 / (02) 380-8224





Espagrotec®

**ORGULLO DE
SER AGRICULTOR**

Almacenar en un sitio seguro, retirado de alimentos y medicinas para consumo humano o animal, bajo condiciones que garanticen su conservación (lugar oscuro, fresco y seco). Conservar el producto en el empaque original, etiquetado y cerrado.

Nunca transporte los plaguicidas junto con productos alimenticios.

Después de la aplicación, lavar el equipo de aspersión interna y externamente en el campo y asperjar el líquido de enjuague en el cultivo.

Lavar las boquillas de aspersión con agua a una presión más alta que la normal de aplicación.

DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase, vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Recolectar los envases y entregarlos al distribuidor para su disposición fina.



Av. General Enríquez # 8 y Av. General Rumiñahui
Parroquia Cotogchoa - Vale de los Chilos
(02) 208-0350 / (02) 208-2068 / (02) 380-8224